

GAMME COMPLETE DE CQI POUR TDA

Test direct à l'antiglobuline

Pratiqué lors d'une réaction post-transfusionnelle, de maladies auto-immunes ou en cas d'anémie hémolytique du nouveau-né, l'examen direct à l'antiglobuline permet la recherche de la fixation d'anticorps anti-IgG et/ou anti-complément à la surface des hématies, potentiellement responsables d'une hémolyse. **La réalisation de ce test impose d'utiliser, de façon simultanée et indépendante, un anticorps anti-IgG et un anticorps anti-C3d ainsi que des témoins réactifs appropriés.**

NOS KITS CONSTITUENT POUR LES LABORATOIRES UN MOYEN DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE L'ARRÊTÉ DU 15 MAI 2018 QUI FIXE LES NOUVELLES CONDITIONS DE RÉALISATION DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE D'IMMUNO-HÉMATOLOGIE ÉRYTHROCYTAIRE ET DE CONTRÔLE RÉGULIER DES ÉQUIPEMENTS ET MÉTHODES D'ANALYSE DE LABORATOIRES.

2 KITS POUR VALIDER L'EXAMEN COMPLET

CONFORT

Disponibles séparément ou dans un package, ces produits sont livrables sur abonnement avec une **expédition toutes les 4 semaines.**



SÉCURITÉ

Strictement contrôlés à chaque étape de leur fabrication, les CQI sont utilisables comme un échantillon de patient. **Ils sont adaptés pour être utilisés en technique manuelle ou automatisée.**



INDÉPENDANCE

L'IBJB n'est pas fabricant d'automate IH ce qui garantit son indépendance.

« L'utilisation de CQI d'origine indépendante du couple appareils/réactifs est la plus recommandée pour assurer en toute indépendance un contrôle interne de qualité efficient. » (1)



RÉFÉRENCE 97257

DAT-QC IgG

RÉFÉRENCE 97367

DAT-QC C3b-C3d



2 coffrets indépendants de 2 x 4 ml pour une stabilité du produit et une durée d'utilisation optimisées
Hématocrite: 25% DAT-QC IgG et 15% DAT-QC C3b-C3d
Péremption : 5 semaines à réception, 14 jours après ouverture.

03 26 79 72 72 • CONTACT@IBJB.FR • WWW.IBJB.FR